

## ミニリンメルトOD錠

内服

分類	夜尿症薬
一般名	デスモプレシン酢酸塩水和物
効果・ 効能	<ul style="list-style-type: none"><li>・尿浸透圧または尿比重の低い夜尿症の治療に使用します。 (1日1回就寝前に服用)</li><li>(水なしで服用、舌の下に入れると速やかに溶ける)</li></ul>
気をつけてほしい副作用	<ul style="list-style-type: none"><li>・過度に水を飲み過ぎると、水中毒になるおそれがあります。投与の2～3時間前(夕食後)より翌朝までの飲水は極力避けて下さい。</li><li>・過度に飲水した場合には服用を中止すること。</li><li>・水中毒が心配される症状(倦怠感、頭痛、悪心・嘔吐など)があらわれた場合にはすぐに投与を中断し、診察を受けて下さい。</li></ul>
ほかに注意してほしいこと	<ul style="list-style-type: none"><li>・原則として6歳以上が対象です。</li><li>・定期的(3か月前後)に治療を中止して夜尿状態を観察するなどし、漫然と投与をしないことが求められています。</li></ul>
メーカー	フェリング・ファーマ(株)

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

2020/08

塚田こども医院

☎025-544-7777